

جنسی امراض

کا

ہومیوپیتھک علاج



ہومیوپیتھک ڈاکٹر فتح شیر

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتب	_____	جنسی امراض کا ہومیو پیتھک علاج
مصنف	_____	ہومیو پیتھک ڈاکٹر فتح شیر
تاریخ اشاعت	_____ ۱۹۹۰	
تعداد	_____ ۳ ہزار	
قیمت	_____ ۲۵ روپے	
طبع	_____	پریس بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ راولپنڈی

ناشر۔ الفتح ہومیو پیتھک دواخانہ، علیہ مجید روڈ راولپنڈی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف

موجودہ دور میں انسانی صحت کے لئے مختلف قسم کی ادویات اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اُس کے جنسی مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر افراد جنسی کمزوریوں اور عیاشیوں میں پڑ کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں۔ سفیما اور ٹیلی وژن کے علاوہ اشتہاری حکیم اور بیشتر دوا ساز کمپنیاں جنسی مسائل کو مشہور کرنے اور انہیں ہر جگہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ان اداروں نے ایک سنجیدہ مسئلے کو ایک تجلّتی مسئلہ بنا لیا ہے۔

جنسی خرابیاں دور کرنے کے لئے جو میوہ میٹھک طریقہ علاج میں نہایت اعلیٰ ادویات موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب مریض میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ اُن تمام بُرے افعال سے باز آجائے جن کا وہ مرتکب رہا ہو۔ اگر مریض خود اپنے رویے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا کرنے کا اہل نہیں تو پھر اُسے کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

جنسی خامیوں یا بیماریوں کے لئے جو میوہ میٹھک اور بالو کیمک ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ اُن کی اجماعی علامات اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں۔ عمدہ نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے اور مریض کے لئے صرف ایک دوا منتخب کی جائے ایک سے زیادہ ادویات دینا یا ان کو ملا کر دینا، بادی بادی دینا یا ادویات کو جلد جلد تبديل کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

ادویات کا استعمال 30 پونسی سے شروع کرنا مناسب ہے۔ پھر حسب ضرورت دوا کی پونسی کو 200 یا 1000 یا ایک لاکھ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں درجہ تکچہ 3 یا 6 یا 12 طاقت تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ بالواسیکیمک ادویات کا استعمال 6x سے شروع کرنا موزوں ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق 12x یا 30x یا 1000 تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ دوا کی چار خوراکیں روزانہ کافی ہیں۔ لیکن 200 یا 1000 طاقت کی ایک خوراک ہفتے میں ایک ہی دفعہ دینی چاہیے۔ ایک لاکھ طاقت کی ایک خوراک ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

فتح شیر

الفتح ہومیوپیتھک دواخانہ

علیہ مجید روڈ - راولپنڈی

فہرست حصہ اول (مردانہ)

صفحہ

مضمون

1	احلام
6	ایستادگی
10	بغل گیری
11	انزال
13	جریان
14	مادہ منویہ
15	جلق
18	جملع
26	نامردی
30	عضو مخصوص
31	بہ اثرات
34	ذہنی علامات

حصہ اول

(مردانہ)

احتلام

1۔ احتلام کی پرانی شکایت جس کی وجہ سے مریض بہت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرے۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی اُسے لگاؤ نہ رہے۔ مریض اپنی صحت کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتا ہو۔

فاسفورک لیسٹ

2۔ ایسے مریض میں احتلام کی شکایت جو اکثر سرد اور ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا رہتا ہو۔ رہنے، پہننے، کھانے پینے میں عیاش ہو۔ سالہ دار غذائیں استعمال کرے۔ کثرتِ مباشرت یا جلق لگانے کا عادی رہا ہو۔ احتلام زیادہ تر صبح کے وقت ہوتا ہو۔

نکس و امینکا

3۔ بکثرت احتلام کی وجہ سے مریض بہت کمزور ہو جائے۔ مریض غلیظ جو چلہ کی تکالیف میں مبتلا رہتا ہو۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں عموماً جلن کا احساس بھی پایا جاتا ہو۔

سلفر

4- موٹے پلپے افراد میں احتلام۔ احتلام کے بعد ہم جسم پر خصوصاً ہاتھ پاؤں پر پسینہ آجائے۔ احتلام صبح 3 بجے سے تھوڑا بعد ہو۔

کلکیر یا کلاب

5- جنسی خواہشات دب جانے سے احتلام ہونے لگے۔ خضیوں میں درد رہتا ہو چکر آتے ہوں۔

کو نیم

6- کثرت مباشرت یا جلق کی وجہ سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات چھائے رہتے ہوں۔

سٹفی سائیکیریا

7- احتلام و جریان ایسے افراد میں جو برسوں جلق لگانے کے عادی رہے ہوں۔ گہری نیند میں احتلام ہو جائے لیکن مریض کو جاگ بھی نہ آئے۔ نبض سست ہو اور دل کی تکلیف بھی ساتھ ہو تو یہ ترجمیمی دوا ہے۔

ڈبجی میلز

8- بکثرت احتلام کی وجہ سے شدید کمزوری، غشی اور اندھلپن ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ کانوں میں گھنٹیاں سی بجتی ہوں۔ پیٹ ہوا سے پھولا رہے۔ چائنا

بغیر ایستادگی کے احتلام

1- احتلام عموماً جلق لگانے کا نتیجہ ہو۔ عضو ٹھنڈا، ڈھیلا، لٹکا ہوا۔ مریض ذہنی لحاظ سے صحت مند لیکن جسمانی طور پر کمزور ہو۔

لایکوپوڈیم

- 2- احلام جلق نکلنے کی وجہ سے ہو۔ مریض کے ذہن میں ہر
وقت جنسی خیالات کی کثرت رہے۔
شغلی سائیگیہ
- 3- احلام کے بعد گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔
ڈائسکوریہ
- 4- احلام کے بعد گردہ ہونے لگے۔
کوبا اتم
- 5- احلام کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔
کریفاٹس

خون آنا

- 1- احلام میں خون آنے یا خون آمیز مواد خارج ہو۔
مرک سبل۔ کینٹھرس
- لیڈم پال۔ سلا سپرلا
- پرو لیم۔ لیکیس۔

وقت اور وقفہ

- 1- احلام اکثر صبح کے وقت ہوتا ہو۔
نکس و امیکا
- 2- احلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہوتا ہو۔
ہلکیر یا کارب
- 3- تقریباً ہر رات ہو جاتا ہو۔
نیشرم فاس
- 4- جلق کے نتیجے میں احلام تقریباً ہر رات ہو۔ ایستادگی نہ
ہو۔ عضو تناسل مرجحایا ہوا۔
ار جنٹم میٹ
- 5- ہر دوسری رات ہو جائے۔
پلرک ایسڈ
- 6- ہر تیسری یا چوتھی رات ہو جائے۔
نکس و امیکا
- 7- احلام بکثرت ہوتا ہو۔ رات کو دو دو تین تین بار ہو
جائے۔ بعد میں گھٹنوں میں شدید کمزوری محسوس ہو۔
ڈائسکوریہ

جنسی خواب اور احتلام

1- جنسی خواب دیکھنے سے صبح کے وقت احتلام جو ہر تیسری یا چوتھی رات کو ہو جایا کرے۔

نکس و امیکا

2- جنسی خواب دیکھنے سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ صبح نیم خوابی کی حالت میں ایسا دیکھتا ہو۔ لیکن جاگ اٹھنے پر ایسا دیکھتا ہو۔ جس بات کے متعلق سوچتا سوچتا سو جائے۔ اسی کے خواب ساری رات نظر آئیں۔

کیلیڈیم

3- جنسی خواب دیکھنے سے کثرت احتلام جو نامردی کا باعث بنے۔ جنسی خیالات مریض کے ذہن پر سوار رہیں۔

فاسفورس

4- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ مریض اپنی صحت کی خرابی کے متعلق بہت فکر مند ہو (فاسفورک ایسڈ)

سٹیفی سائیکیریا

5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جانے کی چند دیگر ادویات

سیلفیم۔ سارپریٹا

ڈائسکوریٹا

بغیر خواب کے احتلام

1- بغیر خواب کے احتلام ہو جائے۔

ارجنٹم ٹائٹ۔

پیکرک ایسڈ۔ جیلیم

ڈیٹیل

بایو کیمک ادویات

- 1۔ احلام بغیر استادگی کے جو جائے ۔ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو ۔ اعصابی کمزوری بھی ہو۔
کلی فاس
- 2۔ خواب کے بغیر احلام ہو ۔ مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو
نیرم فاس
- 3۔ ذہن بروقت جنسی خیالات میں مبتلا رہے ۔ اسی وجہ سے احلام ہو جاتا ہو۔
سلیشیا
- 4۔ احلام کے بعد سردی اور سستی محسوس کرے اور شہوت کا زور ہو جائے۔
نیرم میور
- 5۔ جنسی خواب دیکھنے سے احلام ہو جائے ۔ مریض پست ہمت، نگین چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔
کلی فاس

ایستادگی

ایستادگی کی شدت

- 1- شدید ایستادگی خصوصاً رات کے وقت جس کی وجہ سے عضو میں درد ہو۔ مریض تمام رات بے چینی سے گزارے۔
پکڑک ایسٹ
- 2- خواہش کی زیادتی جس کی وجہ سے نہایت تیز اور مسلسل ایستادگی رہے۔ رات کی شدید ایستادگی سے نیند میں خلل آجائے (پکڑک ایسٹ)
کیفیت خراب
- 3- خواہش کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف دہ ایستادگی جس کے بعد پیشاب کی نالی میں سوئیاں پھینچنے کا احساس ہو۔
کنایس شلہ نوا
- 4- بار بار ایستادگی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ حد سے بڑھی ہوئی جھلکی خواہش۔ مریض کو جماع کا بخنوں ہو۔
فاسفورس
- 5- شدید ایستادگی جس سے پینٹ میں درد ہونے لگے۔ مادہ منویہ مشکل سے خارج ہو یا اس کا اخراج نامکمل ہو۔
زنکم میٹ
- 6- شدید ایستادگی کی چند دیگر ادویات۔
پلائینا - پلسا میلا -
نکس و امیکا
فلورک ایسٹ

ایستادگی کے اوقات اور مواقع وغیرہ

- 1- جملع کا خیال آتے ہی فوراً ایستادگی ہو جائے۔
 قاسفورس۔
 زنگم میٹ
 برٹا کلب
- 2- ایستادگی درے ہو۔
 3- ایستادگی صبح کے وقت ہو۔
 اونیٹا کلب۔
 اگنس کاشن
- 4- صبح نیم خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو جو جانے پر ختم ہو جائے۔
 کیلیڈیم
- 5- صبح کے وقت جملع کی خوابش کے بغیر ایستادگی ہو۔ عضو
 سن اور اس کے سرے پر شہوانی خلش ہو۔
 امبراگ ریا
- 6- نیند کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جانے پر ختم ہو جائے۔
 اوہیم
- 7- ایستادگی صرف رات کے وقت ہو۔
 پکرک ایسٹ
 کینتھرس۔ پلاٹینا
- 8- ایستادگی کھاتا رہے۔
 قاسفورس۔ آرم میٹ
 فلوک ایسٹ۔
 ہائٹرک ایسٹ۔
- 9- بوڑھے آدمیوں میں بکثرت ایستادگی۔
 کینتھرس
 کاشنیکم
- 10- لیٹ جانے پر ایستادگی ہو جائے۔
 اگزالٹ ایسٹ

- 11۔ کمانے سے ایستادگی ہو جائے۔
- 12۔ پیشاب کرنے کے بعد ایستادگی ہو جائے۔
- 13۔ گاڑی میں سوار ہونے سے ایستادگی ہو جائے۔
- 14۔ گھوڑے پر سواری کرنے سے ایستادگی ہو جائے۔
- 15۔ انزال کے بعد ایستادگی ہو جائے۔

کینٹھرس
نیٹرم کادرب
کلکیریا فاس
کنڈلس انڈیکا
فاسفورک ایسڈ

نامکمل ایستادگی

- 1۔ بوس وکنار اور دوسرے جنسی ہیجانات سے بھی ایستادگی نہ ہو۔
- 2۔ جماع میں ایستادگی کے بغیر ہی انزال ہو جائے۔
- 3۔ ایستادگی برائے نام ہو۔ انزال کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔
- 4۔ ایستادگی موجود ہو لیکن جماع کی کوشش پر عضو ڈھیلا پڑ جائے۔
- 5۔ جماع کے دوران ایستادگی نامکمل ہو۔

کیلیڈیم۔ نیوفرلٹیم
کیلیڈیم۔ سیلیم
سیلیم
کیلیڈیم۔ سیلیم
اکنس کاسٹنس۔
ارجنٹم میٹ
فاسفورک ایسڈ۔
اکنس کاسٹنس۔
گریفٹائٹس۔ سلفر۔
کونیم۔ لانیلوپوڈیم۔
سیمیا

6۔ بغیر استراحتی کے جملے کی خواہش ہو۔

کیلیڈیم۔ کوثر۔
لائیکوپٹو ڈیم۔
گرمائش

بالیو کیمک ادویات

1۔ استراحتی کے وقت عضو میں کمی اور درد ہو۔ درد کی وجہ
عموماً سوزاک ہو۔

نیشتر فاس۔
میگنیشیا فاس۔
کالی فاس
کلکیریا فاس۔

2۔ استراحتی تکلیف دہ ہو۔

نیشتر سلف
فیرم فاس۔ سلیشیا

3۔ رات کے وقت تکلیف دہ استراحتی ہو۔

4۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت استراحتی ہو جائے۔ جس میں

کلکیریا فاس۔

جملے کی خواہش نہ ہو۔

بغل گیری

- 1- ایستادگی موجود ہو لیکن بغل گیر ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ نکس دامیکا
- 2- ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ کو نیم
- 3- بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جائے۔ زخم میت
- 4- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلنیم۔ لائیکو پوڈیم۔ کو نیم۔ کلکیر یا کلاب سیلنیم
- 5- بغل گیر ہونے پر بھی ایستادگی نہ ہو۔
- 6- بغل گیری ہی میں ہو جائے۔ لائیکو پوڈیم
- 7- بغل گیر ہونے کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔ میوریس
- 8- ساتھ کھڑے لوگوں سے بغل گیر ہونے کی خواہش۔ پلامینا۔ اگریس

انزال

- 1- انزال کے بعد تکلیف ہو جانے۔
نکس وامیکا۔
- 2- چلے میں بغیر استادگی کے انزال ہو جانے۔
کلی کلاب کیلیڈیم۔ جیلسم
- 3- مکمل استادگی سے پہلے ہی انزال ہو جانے۔ انزال درد کے ساتھ ہو۔
سفر
- 4- انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔
نکس وامیکا۔
سٹفی سائیکریا
- 5- انزال بہت دیر سے ہو۔
فاسفورک ایسٹ
- 6- انزال دیر سے ہو۔ اور بعض اوقات جو ہی نہیں۔
کلیکریا کلاب
- 7- انزال میں ایسے محسوس ہو۔ جیسے مادہ منویہ پھیل دینے والا ہے۔
گر بقائٹس۔
لانی سین

سرعتِ انزال (دیکھئے بغل گیری بھی)

- 1- مکمل استادگی سے پہلے یا اس کے فوراً ہی بعد انزال ہو جانے۔
سفر۔
- فاسفورک ایسٹ

2- دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ منی کا اخراج درد کے ساتھ ہو۔

سلفر

3- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ لیکن عضو کمزور ہو۔ جلد انزال ہو جائے۔

نیشترم میور

4- جماع کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔

کریفائٹس۔

زنگم میٹ

5- سرعتِ انزال۔ ایستادگی برائے نام۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ ہو۔

سیلنیم

6- سرعتِ انزال۔ جماع کے بعد کمزور اور کمزوری ہو جائے۔

سٹیفی سائیکیریا

7- سرعتِ انزال، جریان، نامردی جو جلق لگانے کی وجہ سے ہو جائیں۔

یوفو

عورت کی موجودگی

1- عورت کی قربت سے، اُسے دیکھنے سے یا اُس کا خیال آنے سے ہی انزال ہو جائے۔

کوئیم۔ سیلنیم

پیکرک ایسٹ۔

2- عورت کو چھونے سے ہی انزال ہو جائے۔

میوریکس

3- عورت کی قربت سے، جماع کا خیال آنے سے یا بوس و کندا سے انزال ہو جائے۔

کوئیم

بایو کیمک ادویات

کلیریفاس۔

1- سرعتِ انزال

کالی فاس۔ نیشترم میور

جریان

- 1- اُنٹے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور پاخانہ کرتے وقت منی یا مذی کے قطرے خارج ہوتے ہیں۔
 - 2- بوس وکنڈ کے دوران مذی خارج ہونے لگے۔
 - 3- پاخانہ پر زور لگانے سے مذی کے قطرے بہنے لگیں۔
 - 4- قبض کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ منی یا مذی کے قطرے خارج ہوں۔
 - 5- مشت زنی یا کثرتِ مباشرت سے جریان منی ہو جائے۔
 - 6- منی یا مذی کے قطرے کرتے رہنے سے نظر کمزور ہو جائے۔
 - 7- جریان جب کہ دل کی غیر معمولی دھڑکن بھی ہو۔
- سیلیم
کونیم۔ اگنس کاشس
ایلوینڈ۔ اناکارڈیم۔
اگنس کاشس
نکس واسیکا۔ سفر
فاسفورک ایسٹ۔
سٹفی سائیگیریا۔
فاسفورس۔ یونو۔
کلی کلاب
ڈبی ٹیلز۔
برشا کلاب

بایو کیمک ادویات

- 1- جریان منی یا مذی
- نیٹرم فاس۔
- کلی فاس۔
- نیٹرم میور سلیشیا۔
- کلییر سلف

مادہ منقویہ

- 1۔ پانی کی طرح بہتا ہو۔
 - 2۔ خونی ہو۔
 - 3۔ خون آمیز ہو۔
 - 4۔ جس کی تیز بو ہو۔
 - 5۔ بوگندے پریشاب کی مانند ہو۔
 - 6۔ گرم ہو۔
 - 7۔ ٹخنہ اہو
- سیلیم۔ سلفر۔
سیپیا۔ نیٹرم فاس
لائیکوپوڈیم۔
فلورکب ایسڈ
مرک سال۔ لیڈم۔
سار سپرٹا۔ سٹابرس
لیکیس
نیٹرم فاس
کلکیریا کارب۔
ٹرسٹولائیو بنس۔
اکریکس
نیٹرم میور

جَلَق

(مشت زنی، خود لذتی)

عادت، رجحان

1۔ جلق لگانے کا زبردست رجحان ہو

یوفو۔ پلاٹینا۔
اور بیگانہ
سٹیفی سائیکیرا
فاسفورک ایسڈ
لیکیمس۔

2۔ مریض جلق لگانے کی وجہ سے انتہائی پشیمان ہو۔ اور اپنی
صحت کی خرابی سے فکر مند رہتا ہو۔ جلق لگانے اور انعام
بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید ہے۔

فاسفورک ایسڈ

3۔ مریض تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہو تاکہ مشت زنی کر
سکے۔ اسی وجہ سے سرعتِ انزال، جریان اور نامردی ہو
جائے۔

یوفو

4۔ بڑی بوئی جنسی خواہش اسے پاگل سا بنا ڈالے
(فاسفورس) اور جلق لگانے کی طرف مائل کر دے۔ جلق

کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لئے قابل اعتماد ادویات میں (فاسفورک ایسڈ) اور کچا نم۔ اسٹیکو

5۔ ایسے مریض میں جلق کی عادت دُور کرے جسے صبح غنودگی کی حالت میں ایسا دُگی ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ایسا دُگی ختم ہو جائے۔ عضوسرں لٹکا ہوا اور پلپلا ہو۔ کیلیڈیم

6۔ جلع کی خواہش دب جانے سے اگر مریض جلق کھانے لگے تو اُس کی عادت کو روکے گی۔ اگر مریض کو چکر بھی آتے ہوں تو ترکیبی دوا ہے۔ کونیم

7۔ بلوغت سے پہلے ہی جلق کھانے کا عادی ہو جائے۔ نیند کے دوران مشت زنی کرے۔ جلق کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو دُور کرتی ہیں۔ نکس واسیکا۔

پلائینا

جلق سے تکالیف (دیکھئے بد اثرات بھی)

- 1۔ جلق باز جو اعصابی تکالیف اور ذہنی و جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں۔ مریض مرد ہو یا عورت۔ کللی فاس۔ جیلسمیم
- 2۔ نوجوان جو جلق کھانے یا کثرتِ مباشرت سے نامرد ہو جائیں لائیکوہوڈیم۔ کیلیڈیم
- 3۔ جلق کھانے سے شدید کمزوری یا دیوانگی ہو جائے۔ مریض کی آنکھوں کے نیچے سیاہی مائل نشان ہوں۔ مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس میں شرمیلاہن پایا جائے۔ مشت زنی چھڑانے کے لئے بہت اچھی دوا ہے (اسٹیکو) سفیر سائیکرا

4۔ جلق لگانے یا کثرتِ مباشرت سے عضوِ لوتھڑے کی مائتہ
ڈھیلا ہو جائے۔

خیلیہ ایم۔
چیلسمیر۔

کنس کاسٹرس

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس

1۔ جلق لگانے کا رجحان ہو۔

2۔ جلق لگانے کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ مریض شرمیلا

کلی فاس

چڑھڑا اور کم ہمت ہو جائے۔

جماع

خواہش کی زیادتی

1- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایسا تاگی بغل
گیر ہونے پر ہی ختم ہو جانے۔

کیلیڈیم۔ سیلفیم۔
کونیم۔ نکس وائیکا
لائیکوپوڈیم۔

2- جنسی خیالات زیادہ ہوں لیکن طاقت جماع ختم ہو جانے۔
عام جسمانی اور ذہنی کمزوری۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ

سیلفیم

3- ایک ہی رات میں کئی بار جماع کرنا چاہے۔ لیکن جماع کے
بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جانے۔ مریض اپنی صحت کی
خرابی سے فکر مند رہے۔

فاسفورک ایسڈ

4- جماع کی شدید خواہش ہو۔ دھیان ہر وقت جنسی معاملات
میں لگا رہے۔

سٹفی سائیکیریا

5- بوڑھے آدمیوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن
دراصل وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔ سیلفیم

6- جماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو
تکا کر دے جبکہ جماع کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

فاسفورس

7- جلع کی شدید خواہش ہو۔ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو
جانے اس کے برعکس جلع سے بے رغبتی اور استلا کی
کلیا نکل نہ ہونا بھی پایا جاتا ہے۔

گریفائٹس

8- کبھی جلع کی خواہش بہت زیادہ ہو اور کبھی اس کی رغبت
ہی نہ رہے

پلسائٹلا

پلائینا

9- جلع کی شدید خواہش کے ساتھ بدن میں لرزہ آجانے۔

10- مرد یا عورت میں جلع کی خواہش بڑھ جانے خواہ بوڑھے
ہی ہوں۔

ماسکس

11- کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے جلع کی خواہش
بڑھ جائے۔

کونیم۔ پلسائٹلا۔

کیمر۔ لانی سین

خواہش کی کمی

1- جلع کی رغبت ہی نہ رہے

گریفائٹس۔

نیوفرلیم۔ سفر

2- جلع کی خواہش ہی نہ رہے اور نہ ہی جلع کرنے کی طاقت
ہو۔

اگنس کاسٹس۔

کیلیئم۔ سیفیم۔

اناسموڈیم

گریفائٹس۔ سیپا

کالی بانی

3- مرد یا عورت کو جلع سے نفرت ہو جانے۔

4- موٹے آدمی میں جلع کی خواہش نہ رہے

- 5- جماع کی خواہش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہے۔ جماع میں لطف نہ آئے۔ عضو ٹھنڈا۔ لائیکوہیڈیم
- 6- جماع کی خواہش کم ہو جانے کی چند دیگر ادویات۔ سنفی سائیکیریا۔ سلیشیا۔ برشا کلاب

جماع کے دوران

- 1- تکلیف بڑھ جائے۔ کینٹھرس۔ سیلفیم کریفائٹس۔ کلی کلاب
- 2- درد ہونے لگے۔ ار جنٹم ٹائٹ۔ کلکیریا کلاب
- 3- انزال نہ ہو۔ سیل سیرولینا۔ گریفائٹس۔ ملی لوئس
- 4- انزال سے درد ہونے لگے۔ سلفر۔ مرک سال
- 5- انزال میں مادہ منویہ ٹھنڈا ہو۔ نیٹرم میور
- 6- انزال میں مادہ گرم ہو جس سے پیشاب کی نالی میں جلن ہونے لگے۔ اگر یکس

7۔ لطف آنے کے کچھ وقت بعد ہی منی خارج ہو یا جماع میں
لطف نہ آئے عضو پر گہ گہ سی ہونے لگے جس کی وجہ سے

علیحدہ ہونا پڑے۔

کلکیر یا کلاب

8۔ عضو وحید پڑ جائے۔

کیلینڈیم

9۔ تشنج ہو جائے۔

یوفو

10۔ یمنہ آجائے

لائیکو پوڈیم۔

برشا کلاب

جماع کے بعد

1۔ محالیف پیدا ہو جائیں

اگر کس۔

کلی کلاب

کلکیر یا کلاب

سلیشیا۔ سیپیا

کلی کلاب۔

2۔ احتلام ہو جائے۔

برشا کلاب۔

نیٹرم میور

فاسفورک ایسٹ

3۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔

سیپیا

4۔ بے چینی ہو جائے۔

کلکیر یا کلاب۔

5۔ بے چینی، کاللی اور کمزوری ہو جائے۔

سیلفنر

6- باتیں بھولنے لگے۔ فاسفورک ایسڈ۔

نیٹرم فاس

نیٹرم فاس۔

گریفائٹس

7- پسینہ آجائے

8- ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آجائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری

محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

کلکیریا کارب

شقی سائیکیریا

سیمیل سیرولینا

کینتھرس

اگریکس

گریفائٹس

کلکیریا کارب

کریازوٹ

آئیوڈیم۔

سیمیل سیرولینا

سیمیا۔ بووٹا

ڈافن

امبراگریسیا

اگریکس۔ کالی فاس

فاسفورک ایسڈ

اگریکس۔

6- باتیں بھولنے لگے۔

7- پسینہ آجائے

8- ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آجائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری

محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

9- پیشاب کی حاجت ہو جانے۔

10- پیشاب کرنا مشکل ہو جانے۔

11- پیشاب کی نالی میں درد ہونے لگے۔

12- تشنگ ہو جانے۔ بخوک لگ جانے

13- ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

14- کمزوری بہت ہو جانے۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

15- عضومیں جلن ہونے لگے۔

16- خبیثے سکڑنے لگیں۔

17- کئی قسم کی سحالیف پیدا ہوں۔ خصوصاً چکر آنے لگیں۔

18- دانت درد ہونے لگے۔

19- جماع کی کوشش پر دم ہو جانے۔

20- رزھ کی ہڈی میں تکلیف محسوس ہونے لگے۔

21- سوچ بچار کرنا مشکل ہو جانے۔

22- غش کھا جانے۔

23۔ نے یا علی ہونے لگے۔

24۔ کرورد ہونے لگے۔

25۔ شدید جسمانی کمزوری ہو جائے۔

26۔ شدید جسمانی اور دماغی کمزوری ہو جائے

27۔ گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔

28۔ مریض چہرہ اور حساس ہو جائے۔

29۔ گلین ہو جائے۔

30۔ مریض اپنے گزشتہ برے افعال پر دھکتائے صحت کی

خرابی سے بہت لگرمند ہو۔

سکس

کالی کلاب۔ کہا ٹیم۔

کنڈس ایٹھ کا

اگر سکس۔

کالی فاس۔ چاتل۔

سیلٹیم۔

فاسفورک ایسڈ۔

نکس وایکا۔

کلکیریا کلاب۔

فاسفورس۔ نیٹرم میو

سٹفی سائیگیریا۔

اتاکارڈیم۔

اگنس کاسٹس

فاسفورک ایسڈ

کلکیریا کلاب

سیلٹیم۔ سلشیا

سٹفی سائیگیریا۔

کلکیریا کلاب۔ سیما۔

نکس وایکا۔ کوکیم

سٹفی سائیگیریا۔

فاسفورک ایسڈ۔

سٹفی سائیگیریا

ہیٹرم فیور

اگریکس

مرک کار

کالی کارب

فاسفورس

اگریکس

31۔ خوش مزاج ہو جائے۔

32۔ خوشی اور ہلکا پن کا احساس ہو۔

33۔ معائے مستقیم میں ٹیس اٹھے۔

34۔ نظر ہم ہو جائے۔

35۔ بے خوابی ہو جائے۔

بایو کیمک ادویات

1۔ جماع کی خواہش شدید ہو۔

کالی فاس۔

کلکیریا فاس

نیرم فاس

میگنیشیا فاس۔ سلیشیا

سلیشیا۔ کلکیریا فاس

کالی فاس۔

فیرم فاس

کالی سلف

2۔ ہر وقت جنسی خیالات ذہن پر مسلط رہیں۔

3۔ جماع کی خواہش ختم ہو جائے۔

4۔ جماع کی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔

5۔ جماع کے بعد کمزوری ہو جائے۔ نظر کمزور ہو جائے۔ درد

ہونے لگے۔

کالی فاس

سلیشیا

6۔ جماع کے دوران یا اس کے بعد متلی ہونے لگے۔

7۔ انزال کے بعد تکالیف میں زیادتی ہو جائے۔

سلیشیا۔

نیرم میور۔

نیرم فاس۔

مکھیر فاس۔

کالی فاس۔

کالی فاس۔

8۔ صبح کے وقت خواہش زیادہ ہو۔

نامردی

1- نامردی جو کثرتِ مباشرت، احتلام اور مشت زنی کی وجہ سے ہو مریض غصیل، محتاط اور ہنچے ہنچے کام کرنے والا ہو۔ کھانے پینے میں عیاشی برتے۔ سردی کمر درد قبض اور بواسیر میں مبتلا ہو۔ (یہ دوا خاطر خواہ فائدہ نہ دے تو سلفر دس)

نکس و امیکا

2- نامردی، مریض میں خواہش جماع ہی نہ رہے۔ اکثر احتلام ہوتا رہے سرعتِ انزال ہو۔ مریض شدید نقابست محسوس کرے۔ کمر درد اور باغھے کی خرابیوں میں مبتلا ہو۔ جسم کے مختلف اعضا میں جلن، خصوصاً ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں جلن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

سلفر

3- موٹے، پلپے، مریضوں کی نامردی کی دوا ہے۔ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ انزال کے بعد مریض کو پسینہ آجاتا ہو۔ خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آنے جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے۔

کلکیریا کارب

4- کثرتِ مباشرت اور مشت زنی کی وجہ سے نامردی۔ خواہش جماع کم ہو جانے۔ عضو چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو۔ ایستادگی کم ہو۔ بوڑھوں کی نامردی میں یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ کثرتِ تباکو نوشی سے نامردی کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

لانیکو پوڈیم

5۔ عضو میں ایستھکی نہ ہو۔ جلع کے وقت عضو ڈھیلا ہو جائے۔ اترال ایستھکی کے فوراً بعد اور کبھی ایستھکی سے پہلے ہی ہو جائے اس کے بعد مریض ٹانگوں میں کمزوری محسوس کرے۔ اکثر سٹھ کی ہڈی میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہو۔ جو رات کے وقت بڑھ جاتا ہو۔
فاسفورک ایسٹ

6۔ مکمل نمرودی جو کثرت جلع سے یا بار بار سوزاک ہو جانے سے ہو گئی ہو (تھو جا۔ میڈور۔ ختم)۔ خواہش جلع بالکل نہ رہے۔ عضو سرد اور پھیلا ہو جائے۔ بوڑھے افراد کی نمرودی جو جوانوں جیسی خواہش جلع رکھتے ہوں۔ مریض قبل از وقت بوڑھا ہو جائے۔
اکسٹنٹ

7۔ کثرت مبشرت یا جلق کی وجہ سے نمرودی۔ جلع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جلع کی کوشش پر ایستھکی ختم ہو جائے۔ صبح غنودگی کی حالت میں تو ایستھکی موجود ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ختم ہو جائے۔
کیلینڈیم

8۔ نمرودی، جلع کی خواہش زیادہ ہو۔ لیکن علی طور پر نمرود ہو۔ عضو کمزور اور ایستھکی بہت دیر کے بعد ہو۔ جلع کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔ جلع کرنے پر خود احتمالی نہ رہے۔ اکثر منی یا ندی بہتی رہے۔
سیلفیم

9۔ کثرت جلع یا جلق کی وجہ سے نمرودی ہو جائے۔ مریض گھٹین، چڑچڑاہٹ اور شرمیلا ہو۔ جسمانی طور پر کمزور ہو۔ چہرہ مرجھایا ہوا ہو۔ اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جائیں۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔
سٹنی سائیکس

10۔ نامردی جس میں ایستادگی کم اور تھوڑے وقت کے لئے ہو۔ بغل گیر ہوتے ہی ایستادگی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ زیادہ عرصہ تک کنوارا رہنے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔
کو نیم

11۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک ہو۔ لیکن کثرتِ جماع، کثرتِ احتلام، جلق یا نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ جماع کے خیالات بہت زیادہ ہوں اور جماع کی خواہش کار و کنا مشکل ہو جائے۔ تاہم نامردی ہو۔
فاسفورس

نامردی کی چند دیگر ادویات

- 1۔ کثرتِ جماع کی وجہ سے جماع کی خواہش ہی نہ رہے۔ لہذا نامردی ہو جائے۔
کرفائٹس
- 2۔ عضو کی شدید کمزوری، نامردی، بغیر ایستادگی کے احتلام ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے کانپے۔ خضیوں پر پسینہ آئے۔
جیلسمیم
- 3۔ مادہ منویہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔
چائنا
- 4۔ زیادہ ترس کے ساتھ نامردی بھی ہو۔
ماسکس
- 5۔ عضو کی شدید کمزوری اور مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے نامردی۔
برٹاکارب
- 6۔ چوٹ لگ جانے سے نامردی ہو جائے۔
آرنیکا۔ ہائپرکیم

7۔ نامردی، جماع نہ کرنے کے۔ عضو وسیلا ہو۔ جماع کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔

لائیکوپوڈیم۔
کیلڈیم۔
جینٹیم۔ سیلفیم۔
کلکیریا کلاب۔
کیلڈیم۔ سیلفیم۔
اکنس کاسٹس
ارجنٹم نائٹ

8۔ نامردی، جماع کی کوشش پر راستگی ختم ہو جائے۔

9۔ بوڑھوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔
سیلفیم۔
اکنس کاسٹس

بایو کیمک ادویات

1۔ نامردی

نیٹرم فاس۔
کلکیریا فاس۔
کلی فاس سر نیٹرم میور

عضو مخصوص

- 1- عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پلپٹا
کیلیڈیم۔
اگنس کاسٹس۔
سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔
نیوفریٹم
- 2- عضو سرد اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے۔
کیلیڈیم
- 3- عضو چھوٹا رے کی ماتہ سکڑا ہوا لیکن ایستادگی پر مکمل
ماسکس
- 4- عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کھچا ہوا۔
اکنیشیا
- 5- عضو ڈھیلے اور مر چھایا ہوا۔
سٹفی سائیکیریا
- 6- عضو محض چھوٹے، نلے یا دبائے پر ہی ایستادہ ہو جائے۔
میوریکس۔
- 7- عضو کا اگلا سرائن ہو جائے یا اس پر کسی چیز کے رینگنے کا
لیک کنا تھم۔ چاتبا
احساس ہو۔
- 8- نامردی میں یہ احساس کہ عضو موجود ہی نہیں۔
فاسفورک ایسڈ
- 9- احساس کہ عضو سی سے بندھا ہوا ہے۔
کوکین
- 10- اعضائے تناسلی قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔
پلمیم
پلاٹینا

بداثرات

1۔ مادہ منویہ کے بکثرت ضائع ہو جانے سے جسمانی کمزوری۔
آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ کانوں میں گھنٹیاں بھیں۔
پیٹ ہوا سے پھولا ہوا ہو۔ حاد اثرات کے لئے ترجیحی دوا
چاہئے۔

چائنا

2۔ مادہ منویہ ضائع ہو جانے کے مریض اثرات۔ چکر۔ ذہنی
تھکن کمزوری۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ مریض
اپنی صحت کی خرابی کے متعلق فکر مند رہتا ہو۔ زندگی کے
معمولات سے غافل ہو جائے۔

قاسفورک ایسڈ

3۔ کثرتِ مباشرت، کثرتِ مشیت زنی کے برے اثرات۔
مریض نگین اور لالہ روا ہو جائے۔ یادداشت کمزور۔ ذہن پر
ہر وقت جنسی خیالات چھائے رہیں۔

سٹیفی سائیگییرا

4۔ جلق لگانے کے بد اثرات، سردیوں ہاضمے کی تکلیف ہو
جائے۔ کثرتِ مباشرت اور احتلام کے برے اثرات کو
بھی دور کرتی ہے۔ نوجوانوں میں مشیت زنی کے برے
اثرات ختم کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

نکس وایکا

5۔ احتلام، کثرتِ جماع یا مشیت زنی کی وجہ سے اعصابی کمزوری
ہو جائے بعض اوقات دل کی غیر معمولی دھڑکن ہو۔

ایوناسائیوا

6۔ مشیت زنی سے مرگی ہو جائے۔ مرگی سے ہوش و حواس قائم
رہیں۔

قاسفورس

- 7۔ مادہ منویہ ضائع ہونے کے بد اثرات۔ مریض قبل از وقت
بوڑھا ہو جائے۔
اکنس کاسٹس
- 8۔ کثرتِ مباشرت سے فلج ہو جائے۔
نیٹرم میور
- 9۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑنے
لگے۔ جماع کے دوران ہی مرگی کا دورہ پڑ جائے۔
سیوفو
- 10۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کے بد اثرات جبکہ تمام جسم ڈھیلا
ڈھالا ہو گیا ہو۔ معمولی حادثہ یا واقعہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے
لگیں۔
جیلسمیم
- 11۔ کثرتِ مباشرت سے رڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو
جائے۔
اگریکس
- 12۔ کثرتِ جماع اور مشت زنی کے بد اثرات کی دیگر اہم
ادویات۔
پیکرک ایسڈ۔
انا کارڈیم

خواہشِ جماع دب جانے کے بد اثرات

- 1۔ جماع کی خواہش دب جانے سے تکلیف ہو جائے۔
کونیم۔ پلبامیلا۔
ایپس۔ کیمفر
- 2۔ خواہشِ جماع دب جانے یا زندگی بھر کنوارا رہنے کے
بد اثرات اگر چکر بھی موجود ہوں تو یقینی دوا ہے۔
کونیم

بایو کیمک ادویات

1۔ جماع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ بینائی مدہم ہو

جائے۔

کالی فاس
سلیشیا

2۔ جماع کے بعد کمزوری

ذہنی علامات

1۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے۔ یادداشت ختم ہو جائے۔ جماع کے بعد سوچ بچار مشکل ہو جائے۔ خیالات کا سلسلہ قائم نہ رکھ سکے۔ اگلام بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید دوا ہے۔

فاسفورک ایسڈ

2۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو ذہن پر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہے۔ اپنی تکالیف بیان کرنے کے لئے تنہائی کا خواہشمند ہو۔ مریض چڑچڑا شرمیلا اور غمگین ہو۔

سٹفی سائیکیریا۔

3۔ جنسی خیالات کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہے۔ بھول چوک اکثر ہو جاتی ہو۔ ایک کام کر لینے کے باوجود مریض کو یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ خیالات میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ مریض لیٹ جانے کی بے حد خواہش رکھتا ہے۔

کیلینڈیم

4۔ مرد ہو یا عورت جماع کا ضبط سُرپر سوار رہتا ہو۔ کثرت مباشرت اور جلق سے مریض بزدل اور قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے۔ بعض اوقات دیوانہ ہو جائے۔

فاسفورس

- 5۔ جملع کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے نگلین رہنے لگے
اور اسی وجہ سے عورتیں ہسٹریا میں مبتلا ہو جاتیں۔
کو نیم
- 6۔ مریض کو خدشہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ناکام ثابت ہو گا۔
بے حد نگلین ہو۔ زودرنج ہو اور بات بات پر بگڑ جائے۔
مریض خیال کرے کہ کچھ وقت کے بعد موت آجائے گی
اس لئے کوئی کام کرنا فضول ہے۔
اگنس کاسٹس

حصہ دوم (زنانہ)

جماع

1۔ شرمکاه کی خشکی جماع میں رکاوٹ پیدا کرے۔

نیشترم میور۔

لائیکو پوڈیم۔

لائی سین

2۔ شرمکاه نہایت حساس ہو جس کی وجہ سے جماع نہ کیا جا سکے۔

پلائینا۔ تھوجا
کاسٹیک۔ سیمپا۔

بررس ولکرس

بروسیم

کونیم۔

سیسل سیرولیٹا

3۔ جماع میں لطف ہی نہ آئے۔

4۔ جماع کی خواہش دب جانے کے برے اثرات۔

نفرت

1۔ جماع سے نفرت ہو۔ عورت شادی کا خیال تک برداشت نہ کر سکے۔

پلساٹیل

ہائیدراسٹس
کریازوٹ

2- جملع کا خیال ناقابلِ برداشت ہو۔

3- جملع کے خیال ہی سے بے چین اور خوفزدہ ہو جائے۔

شہید خواہش

1- کنواری لڑکی میں۔

2- سیوہ عورت میں

3- بوڑھی عورت میں

4- حمل کے دوران

5- حیض آنے سے پہلے

6- حیض کے دوران

7- بچے کی پیدائش کے بعد عورت جب بستر پر ہو

8- جملع کی خواہش بڑھ جانے کی چند دوسری ادویات۔

پلاٹینا۔ کالی فاس

اودیٹا نمہ۔ ایپس

ماسکس

یلاڈونا

یلاڈونا

پاساٹیل

یلاڈونا

نکس وایکا۔

کلکیریا کارب۔

کالی فاس۔ لیکین۔

کریشی اول

بانیوسائیمس۔

کیٹنٹھرس۔

سٹرامونیم۔

وریفرم البم

خواہش کی زیادتی

- 1- جماع کی خواہش نہایت ہی شدید ہو۔ جنونِ شہوت ہے۔
پلاٹینا۔ اور گانم
میوریکس۔
کلکیریا کلب
- 2- جسم کے کسی حصے کو بھی اگر چھوا جائے تو جنسی خواہش
بھڑک اٹھے۔
میوریکس
اور گانم۔
- 3- جماع کی شدید خواہش جو اُسے جلق کی طرف مائل کر دے۔
زنگم میٹ۔
میوریکس
اور گانم۔ پلاٹینا۔
قاسفورس
- 4- جماع کی شدید خواہش کی وجہ سے بانجھ پن ہو جائے۔
اور گانم۔ پلاٹینا۔
قاسفورس
- 5- جماع کی شدید خواہش جسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو
مصرف رکھے۔
للیم جگ

خواہش کی کمی (دیکھئے نفرت بھی)

- 1- جماع کی رغبت ہی نہ رہے۔
سپینا۔ نیرم میور۔
کاسٹیکم
- 2- جماع کی خواہش کم ہو جائے۔
اگنیشیا۔ انا سموڈیم۔
اگنس ہاسٹس۔
بیلوناس

جملع کے دوران

1- شرمگاہ میں درد ہو

پیچیدہ - نیم گرم سیور۔

در چشم ہائٹ

شقی سائیکیرا۔

مدرس دگرس۔

فنی سین

2- شرمگاہ میں درد محسوس کرے۔ درد جملع کے بعد بھی

رہے۔

3- جملع برداشت نہ کر سکے یا جملع کے دوران غش کھا جائے۔

کریاڈوٹ

پلائینا۔ اور کانم۔

سیور۔ کس

لایکوپوڈیم

4- شدید درد ہو جملع کے دوران شرمگاہ سے ہوا خالیج ہو

جملع کے بعد

1- تکالیف بڑھ جائیں۔

اگر یکس۔ سیلیا

کلیریا کلاب۔

کل کلاب سیل۔

2- تھی شادی شدہ عورتوں کو یہ مشاب کرنے کے لئے زور

لگانا پڑے۔

3- شرمگاہ میں درد ہونے لگے۔

شقی سائیکیرا

کریاڈوٹ

لائیکو پوڈیم - لائی سین
ار جینٹم ٹائمٹ -
کریا زوٹ -
ٹائمٹرک ایسٹ
سپیا - نیٹرم کلاب

4- شرمکاه میں جلن ہونے لگے۔
5- شرمکاه سے بکثرت خون بہنے لگے۔

6- لیکو پیا شروع ہو جائے

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس -
کلکیریا فلور - سلیشیا

کلکیریا فاس

کالی فاس

کلکیریا فاس

فیرم فاس -

کالی سلف

فیرم فاس

سلیشیا

فیرم فاس -

نیٹرم میور

کلکیریا فاس

1- خواہش جماع زیادہ ہو جائے۔

2- حیض آنے سے پہلے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

3- حیض کے بعد جنسی خواہش کا غلبہ ہو جائے۔

4- جنسی خیالات کا غلبہ رہے۔

5- جماع سے نفرت ہو جائے۔

6- شرمکاه گرم، خشک، جماع کے بعد درد محسوس ہو۔

7- جماع کے دوران اور اس کے بعد متلی ہو جائے۔

8- جماع کے دوران شرمکاه میں درد ہو۔

9- جماع کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

جَلَق (انگشت زنی)

- 1- لٹکی میں انگشت زنی کی شدید خواہش -
اور بکائیم - پلاٹینا -
گریشی اولا
- 2- جماع کی شدید خواہش یا شرمگاہ میں خارش جو اسے انگشت زنی کی طرف مائل کر دے -
اور بکائیم - کیلیڈیم -
نکیم سیٹ - میوہیکس
پلسا میلا
- 3- جلق لگانے کی وجہ سے لیکوریا ہو جائے -
- 4- عورت جو جلق لگانے کی مرتکب رہی ہو - وہ شادی کے بعد جماع میں بالکل لطف محسوس نہ کرے -
- 5- شرمگاہ میں شہوانی خارش -
انکس کاسٹس
اور بکائیم - پلاٹینا -
کریازوٹ

متفرق

- 1- جلد ہی حمل ٹھہر جائے -
نیرم میور - مرک سل
- 2- اعضائے تناسل قبل از وقت نشوونما پانے لگیں -
پلاٹینا

ادویات کے تعلقات

اس کتاب میں تقریباً 90 ہومیو پیتھک ادویات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب کو مفید تر بنانے کے لئے صرف ان ادویات کے آپس میں تعلقات درج کر دیئے گئے ہیں۔ جن کی مدد کاں دافع اثر یا مخالف دوائیں بھی ان 90 ادویات میں ہی موجود ہیں۔ وہ ادویات جن کی دافع اثر ادویات تو ہیں لیکن مددکاری یا مخالف ادویات نہیں ہیں انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ ترکیبی دافع اثر دوا ان ادویات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جس کے لئے کسی بھی تفصیلی فہرست سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ادویات	مددکار دوائیں	دافع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
ارجنٹم ٹائٹ	کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔ سلیشیا۔ فاسفورس	کیمفر	
آرنیکا	کلکیریا کارب۔ ورمیرم اہم	کیمفر۔ نیتروم میور	
اکنس کاسٹس	کیلڈیم۔ سیلنیم	کیمفر۔ آرنیکا	
اکنیشیا	نیتروم میور۔ سیپیا۔ فاسفورک اسٹ		
اناکارڈیم	لائیکوپوڈیم۔ پلساٹیل۔ پلائینا		
آئیوڈیم	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا	گریشی ہولہ۔ لہس۔ تھوجا	فاسفورس
لہس	سلفر۔ برشا کارب۔ پلساٹیل۔ آرنیکا	کینتھرس۔ لیکیس۔ یڈم پال	فاسفورس
	نیتروم میور		
برنزس وگلرس	لائیکوپوڈیم	سلاڈونا۔ کیمفر	
برشا کارب	سلیشیا	کیمفر۔ سلاڈونا۔ مرک سال زنگم میت	کلکیریا کارب
بروسیم	ارجنٹم ٹائٹ۔ کالی کارب	کیمفر۔ امونیا کارب۔ اوہیم	
سلاڈونا	کلکیریا کارب۔ مرک سال۔ نیتروم میور	پلساٹیل۔ کیمفر۔ اوہیم۔ ہائیوسائیمس	
میوفو	کلکیریا کارب	لیکیس اوہیم	

ادویات	مددگار ادویات	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
پرو لیم	سپیا	نکس و امیکا۔ فاسفورس	
پلائینا	سپیا۔ انا کا ڈیم	سلاڈونا۔ پلسا میلا	
پلسا میلا	لایکو پو ڈیم۔ سلیشیا۔ کلل بائی۔	نکس و امیکا۔ اگنیشیا	
تھوجا	سپیا۔ زنگم میٹ	سلفی سائیگیرا	
بیلسمیم	سلیشیا۔ مرک سال۔ نیرم میور۔		
	نانٹرک ایسڈ		
	سپیا۔ ار جٹم نانٹ۔ کلکیر فاس۔	نیرم میور۔ قمری نیلس۔ نکس و امیکا	
	کلل کارب	پلسا میلا۔ سلفر۔ وزیٹرم البم	
چائنا	کلکیر فاس۔ کلل کارب	لیکس۔ نیرم میور۔ نکس و امیکا۔	
ڈبی نیلس	سلاڈونا۔ نکس و امیکا۔ سلفر	سپیا۔ پلسا میلا۔ سلفر۔ وزیٹرم البم	
زنگم میٹ	پلسا میلا۔ سپیا۔ سلفر۔ کلکیر فاس	کیمفر۔ لپس۔ کلکیر کارب۔ او ڈیم	
سلفی سائیگیرا	کاسٹیکم	نانٹرک ایسڈ	نکس و امیکا
سپیا	نیرم میور۔ فاسفورس۔ نکس و امیکا	کیمفر۔ اگنیشیا۔	
سیلنیم	نانٹرک ایسڈ۔ نیرم کارب۔ نیرم فاس	کیمفر	
سلفر	کلکیر کارب۔ سلاڈونا	—	لیکس۔ پلسا میلا
فاسفورک ایسڈ	چائنا	اگنیشیا۔ پلسا میلا	چائنا
فاسفورس	لایکو پو ڈیم۔ کلل کارب۔ سلفر	کیمفر۔ چائنا۔ تھوجا	
فلورک ایسڈ	چائنا	کیمفر۔ سلفر۔ سلفی سائیگیرا	
کاسٹیکم	کرفائنس۔ سلفر۔ سلفی سائیگیرا	کیمفر۔ نکس و امیکا	کاسٹیکم لپس
	لیکس	کیمفر۔ سلفر۔ سلفی سائیگیرا	
		نکس و امیکا	

ادویت	مدکار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مکلف دوائیں
کریازوٹ	فاسفورس۔ سلفر	نکس ولسکا	سلفر
کلکیرا کلاب	سلاؤونا۔ لائیکو پوڈیم۔ برشا کلاب	کیفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس ولسکا	
کونیم	فاسفورس	چاتلا۔ پیسا	
کیسکیم	نیزم میور	نائٹرک ایسڈ	زنک میٹ
کیلینڈیم	نائٹرک ایسڈ	کیفر۔ کیلینڈیم	
کینٹھرس	لہرس	کیسکیم۔ اگنیشیا۔ ہائیو سائیمس	
گرفائنس	ارجنٹم نائٹ۔ کاسٹیکم۔ لائیکو پوڈیم	پلساٹیل	
لائیکو پوڈیم	سلفر۔ لیکیس۔ کلکیرا کلاب۔ آئیوڈیم۔ اگنیشیا۔ کلکیرا کلاب۔ فاسفورس	نکس ولسکا۔ چاتلا	
لیکیس	لائیکو پوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ زنک۔ آئیوڈیم۔ کلکیرا کلاب	کیفر۔ چاتلا۔ کاسٹیکم	پیسا
مرک سال	سلاؤونا۔ پیسا۔ سلفر۔ نائٹرک ایسڈ	مرک سال	امونیا کلاب
نائٹرک ایسڈ	کیلینڈیم۔ پیسا۔ لائیکو پوڈیم	کونیم۔ مرک سال۔ پرو لیم۔ سلفر	لیکیس
نکس ولسکا	پیسا۔ کونیم۔ کلکیرا کلاب۔ فاسفورس۔ پلساٹیل۔ سلفر	کیفر۔ اگنیشیا۔ تھوجا۔ سلاؤونا	لیکیس۔ زنک میٹ۔ کاسٹیکم اگنیشیا
نیزم میور	لہرس۔ کیسکیم۔ ارجنٹم نائٹ	کیفر۔ فاسفورس۔ نکس ولسکا۔ کیفر۔ چاتلا	
ورنٹم البم	آرنیکا		

